



## FASE DEL TRATAMIENTO IHT

Transición a un nivel superior de atención Temas	Fase del tratamiento	Transición a menor nivel de atención Temas
<b>AGUDO</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revise los límites de servicios de IHT (terapia en el hogar)</li> <li>• Avisar a Crisis Móvil de la(s) necesidad(es) de la familia</li> <li>• Crear nuevo plan de seguridad si el actual no es suficiente para administrar el riesgo</li> <li>• Abordar las preocupaciones de la familia acerca de nivel superior de atención</li> <li>• Avise a la escuela y/o otros sistemas que están involucrado con el joven</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agudo/Activo nivel IHT síntomas presentes actualmente</li> <li>• CANS (Necesidades y fortalezas del niño y el adolescente) tiene un numero significativo de 2s y 3s</li> <li>• Desarrollo de una visión compartida con la familia para servicios y cómo medir el progreso</li> <li>• Han comenzado los sistemas familiares inicial de intervenciones necesarias para estabilizar la unidad familiar</li> <li>• El/La joven pueden ser recientemente trasladado a casa desde un nivel superior de atención o tener un caso de asistencia a menores activa (CRA por sus siglas en inglés)</li> <li>• La terapia individual no es suficiente para manejar los factores de riesgo presentes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Introducir servicios de IHT y sus límites</li> <li>• Revisar los criterios de terminación de la familia</li> <li>• Crear una visión compartida de lo que será el aspecto de progreso para la familia</li> <li>• Completar los referidos necesarios para otros niveles de atención</li> <li>• Identificar apoyos naturales para la familia</li> </ul>
<b>TRABAJANDO</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conductas de riesgo aumentan y/o surgen nuevos comportamientos de riesgo</li> <li>• El/La joven pasa a nivel superior de atención</li> <li>• El plan de seguridad necesita ser actualizado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los síntomas son activos, disminuyendo en frecuencia/intensidad/gravedad</li> <li>• Puntuaciones CANS están disminuyendo, 2s y 3s todavía presentes en algunos dominios</li> <li>• Sigue desarrollando una visión compartida con la familia para servicios y cómo medir el progreso</li> <li>• La familia se esta involucrando en las intervenciones necesarias para la estabilización</li> <li>• La familia trabaja con otros proveedores para administrar los factores de riesgo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisar el progreso hacia la visión compartida</li> <li>• Vigilar y atender contratiempos</li> <li>• Re-aplicar los progresos realizados</li> <li>• Las referencias se han realizado y los miembros de la familia se conectan a otros niveles de atención</li> </ul>



## FASE DEL TRATAMIENTO IHT

Transición a un nivel superior de atención Temas	Fase del tratamiento	Transición a menor nivel de atención Temas
<b>TERMINACIÓN</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conductas de riesgo aumentan y/o surgen nuevos comportamientos de riesgo</li> <li>• Los cambios en el sistema familiar causan inestabilidad</li> <li>• El plan de seguridad necesita ser actualizado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Síntomas relacionados con admisión de IHT son estables</li> <li>• Puntuaciones de CANS han disminuido, de pocos a ningunos 2s o 3s</li> <li>• La familia ha cumplido las metas o se ha desconectado de los servicios</li> <li>• La familia es capaz de utilizar sus habilidades sin apoyo clínico</li> <li>• Los factores de riesgo son administrados con éxito a través de menos servicios intensivos</li> <li>• No existe ningún otro problema a nivel de IHT de familia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revise los pasos finales para el cierre del IHT</li> <li>• Crear un plan para la transición a otros servicios</li> <li>• Establecer fecha de cierre</li> <li>• Celebrar reuniones finales con la familia y los proveedores</li> </ul>